子どもの定期予防接種一覧

ワクチン名	接種開始年月日	回数	法律等による接種年齢	その他
ヒブ	**① 生後２カ月～７カ月の前日までに開始した場合**	**３回（２７～５６日の間隔） 追加１回（初回接種終了後７～１２カ月）**	生後２カ月～ ５歳の誕生日の前日まで	**・初回接種開始**は，生後２カ月～７カ月の間にするのが標準です。 ・予診票は、綴りの中にあります。
	② 生後７カ月に至った日の翌日～１歳の誕生日の前日までに開始した場合	２回（２７日～５６日の間隔） 追加１回（初回接種終了後７～１２カ月）		
	③ １歳～５歳の誕生日の前日まで	１回		
小児用 肺炎球菌	**① 生後２カ月～７カ月の前日までに開始した場合**	**３回（２７日以上の間隔） ※１歳の誕生日の前日までに完了 追加１回（１歳以上） ※初回の３回目から６０日以上の間隔**	生後２カ月～ ５歳の誕生日の前日まで	**・初回接種開始**は，生後２カ月～生後７カ月まで。 **追加接種**は，１歳～１歳３カ月に至る日の前日までにするのが標準です。 ・予診票は、綴りの中にあります。
	② 生後７カ月に至った日の翌日～１歳の誕生日の前日までに開始した場合	２回（２７日以上の間隔） ※１際の誕生日の前日までに完了 追加１回（１歳以上） ※初回の２回目から６０日以上の間隔		
	③ １歳～２歳の誕生日の前日までに開始	**２回（６０日以上の間隔）**		
	④ ２歳～５歳の誕生日の前日まで	１回		
Ｂ型肝炎	生後２カ月～生後９カ月に至るまで	３回 ※２７日以上の間隔で２回，１回目の接種から１３９日以上を経過した後に１回	１歳の誕生日の前日まで	・予診票は、綴りの中にあります。
四種混合 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ	第１期 初回 / 生後２～１２カ月	３回 （２０日～５６日の間隔）	生後２カ月～９０カ月に至るまで （７歳６カ月に至る日の前日まで）	・第２期は二種混合になります。 ・予診票は、綴りの中にあります。
	第１期 追加 / ３回目（第１期初回）終了後，１年～１年半	１回		

ワクチン名	接種開始年月日		回数	法律等による接種年齢	その他
二種混合 ジフテリア・破傷風	小学校６年生		１回	１１歳以上～１３歳未満	予診票は個別に郵送します
ＢＣＧ	生後５カ月～生後８カ月に達するまで		１回	生後３カ月～１歳の誕生日の前日まで	・予診票は、綴りの中にあります。
麻しん・風しん（ＭＲ）	第１期	１歳～２歳未満	１回	標準的な接種年齢と同じ	・予診票は、綴りの中にあります。
	第２期	年長児	１回		
水痘（水ぼうそう）	１回	１歳～１歳３カ月に至るまで	１回	１歳～３歳の誕生日の前日まで（１回目と２回目の間は，３カ月以上の間隔をおく）	・予診票は、綴りの中にあります。
	２回	１歳～２歳未満１回目終了後	１回		
日本脳炎	第１期初回	３歳	２回（６～２６日の間隔）	生後６カ月～７歳半に至るまで	・予診票は、綴りの中にあります。
	第１期追加	４歳	１回（第１期初回終了後おおむね１年後）		
	第２期	９～１０歳	１回	９歳以上１３歳未満	予診票は個別に郵送します
子宮頸がん	小学６年生		３回	・小学校６年生～高校１年生に相当する年齢の女子 ・平成９年度～平成１８年度生の女性　※キャッチアップ接種	予診票や通知案内を個別に郵送します。
			２回　※9価ワクチン（シルガード）を15歳未満で接種する場合		
ロタウイルス **（Ｒ２．１０．１～より定期接種化）**	ロタリックス（１価）	生後６週～生後２４週	２回 （初回接種は生後１４週６日まで ２回目は４週間以上の間隔をあける）	①　ロタリックス（１価） 生後６週～生後２４週 ②　ロタテック（５価） 生後６週～生後３２週	・予診票は、綴りの中にあります。 ３回分あるため、ロタリックスを接種した方は、３回目を使用しないでください。
	ロタテック（５価）	生後６週～生後３２週	３回 （初回接種は生後１４週６日まで ２，３回目は４週間以上の間隔をあける）		